



ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЦРЕША И ВИШНА



Време на примена / Фенофаза од развој	Третман против
Зимско прскање (пред почеток на пролетта, за време на бабрење на папките)	Монилија, Шупликавост Бактериози Штитести вошки, јајца од лисни вошки
Бели балони	Монилија Антракноза Лисни вошки
Полно цветање ¹ (само во исклучителни случаи, влажно време н.пр.)	Монилија Антракноза
Прскање по прецветување	Монилија, Шупликавост Свиткувачи, Црешова мува
Плодови во фаза на пораст (14 дена по претходното)	Шупликавост, монилија, дамаквост на листот Лисни вошки
Плодови во пораст до промена на боја на плодот (по потреба)	Дамкавост на листот, шупликавост Црешова мува
После берба (по потреба)	Дамкавост на листот
По опаѓање на листовите	Бактериози, шупликавост

НАПОМЕНА:

Бројот на третирањата е во директна зависност од здравствената состојба на насадот. Доколку насадот во минатата сезона бил одржуван во добра здравствена состојба, бројот на третирањата ќе биде помал. Зимското третирање задолжително да следи по извршената резидба, поради дезинфекција на раните настанати од резидбата. Пред да пристапите кон третман, задолжително консултирајте се со стручни лица и преземете мерки за лична и заштита на човековата околина.

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Заради заштита на корисните инсекти (пчелите) кои го помагаат опрашувањето, третман против штетни инсекти да се врши само до фаза на 10% отворени цутови и после 80% паднати венечни ливчиња!!!

Прегледот на препарати за заштита од болести, штетници и плевели можете да го најдете во делот од порталот [Корисни алатки](#), а начинот и примената на методи од интегралната заштита можете да ги најдете во делот [Интегрално производство на цреша и вишна](#)

¹ Третман во полно цветање само во исклучителни случаи, без употреба на инсектициди!!!