



ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЈАБОЛКА



Време на примена / Фенофаза од развој	Третман против
Зимско прскање (пред отворање на папките)	Габни и бактериски болести Имага и презимувачки форми на штетни инсекти
Глувчи уши	Чадлива краставост Јајца од црвен пајак
Прскање пред цветање Розе папка	Чадлива краставост Пепелница Цутојад, пајаци
Почеток на цветање	Чадлива краставост Пепелница Цутојад, пајаци, рутава буба
Полно цветање ¹ (само при многу влажно време)	Чадлива краставост Монилија
Завршеток на цветање	Чадлива краставост Пепелница Пајаци, вошки, лисни минери (во случај на појава)
Плодови со големина на лешник	Чадлива краставост Пепелница Јаболков црв, пајаци, Лисни вошки, лисни минери (по потреба)
Плодови во големина на орев (по потреба да се повтори после 10-15 дена)	Чадлива краставост Пепелница Јаболков црв, лисни вошки, црвен пајак
Четврто прскање по прецветување (ориентационо околу август)	Чадлива краставост Јаболков црв
Петто прскање (до 15 дена пред берба)	Складишни болести

¹ Третман во полно цветање само во исклучителни случаи, без употреба на инсектициди!!!

НАПОМЕНА: Доколку насадот во минатата сезона бил одржуван во добра здравствена состојба, бројот на третирањата ќе биде помал. Зимското третирање задолжително да следи по извршената резидба, поради дезинфекција на раните настанати од резидбата.

Пред да пристапите кон третман, задолжително консултирајте се со стручни лица и преземете мерки за лична и заштита на човековата околина.

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Заради заштита на корисните инсекти (пчелите) кои го помагаат опрашувањето, третман против штетни инсекти да се врши само до фаза на 10% отворени цутови и после 80% паднати венечни ливчиња!!!

Прегледот на препарати за заштита од болести, штетници и плевели можете да го најдете во делот од порталот [Корисни алатки](#), а начинот и примена на методи од интегралната заштита кај јаболката можете да најдете во делот за [Интегрално производство на јаболка](#)

