

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА КАПИНА



Време на примена / Фенофаза од развој	Третман против
Пред садење (третман на цела површина-по потреба)	Почвени штетници (ларви-грчици, телени црви, гасеници од совици)
Бабрење на папките	Сушење на ластарите, дамкавост по ластарите Штитести вошки и нивни презимувачки форми
Појава на први листови	Сушење на ластарите Пајаци
Пред почеток на цветање	Сушење на ластарите, антракноза Пајаци, јагодов цутојад, вошки
Крај на цветање	Сиво гниење
14 дена пред бербата	Сушење на ластарите, сиво гниење Пајаци, вошки
После берба	Сушење на ластарите Вошки, пајаци
После паѓањето на листовите	Сушење на ластарите

НАПОМЕНА: Доколку насадот во минатата сезона бил одржуван во добра здравствена состојба, бројот на третирањата ќе биде помал.

Пред да пристапите кон третман, задолжително консултирајте се со стручни лица и преземете мерки за лична и заштита на човековата околина.

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Заради заштита на корисните инсекти (пчелите) кои го помагаат опрашувањето, третман против штетни инсекти да се врши само до фаза на 10% отворени цутови и после 80% паднати венечни ливчиња!!!

Прегледот на препарати за заштита од болести, штетници и плевели можете да го најдете во делот од порталот [Корисни алатки](#)