




ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА КРУША



Време на примена / Фенофаза од развој	Третман против
Зимско прскање (пред отворање на папките)	Габни и бактериски болести Јајца од крушкина болва, лисни вошки, зимски јајца од црвен пајак, калифорниски и други штитести вошки
Глувчи уши	Чадлива краставост
Прскање пред цветање Розе папка	Чадлива краставост Пепелница Црвен пајак
Полно цветање ¹ (само при многу влажно време)	Бактериска пламеница Монилија
Завршеток на цветање	Чадлива краставост Пепелница Пајаци, вошки, лисни минери (во случај на појава)
Плодови со големина на лешник	Чадлива краставост Лисни вошки, крушкина оса и други штетници
Плодови во големина на орев (по потреба да се повтори после 10-15 дена)	Чадлива краставост, `рѓа Крушкина болва, лисни вошки, црвливост
Трето прскање по прецветување	Чадлива краставост Крушкина болва, црвливост, вошки
Четврто прскање	За касни сорти (Складишни болести)

НАПОМЕНА: Доколку насадот во минатата сезона бил одржуван во добра здравствена состојба, бројот на третирањата ќе биде помал. Зимското третирање задолжително да следи по извршената резидба, поради дезинфекција на раните настанати од резидбата. Пред да пристапите кон третман, задолжително консултирајте се со стручни лица и преземете мерки за лична и заштита на човековата околина.

¹ Третман во полно цветање само во исклучителни случаи, без употреба на инсектициди!!!

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Заради заштита на корисните инсекти (пчелите) кои го помагаат опрашувањето, третман против штетни инсекти да се врши само до фаза на 10% отворени цутови и после 80% паднати венечни ливчиња!!!

Прегледот на препарати за заштита од болести, штетници и плевели можете да го најдете во делот од порталот [Корисни алатки](#).