



ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА СЛИВА



Време на примена / Фенофаза од развој	Третман против
Касно есенско прскање	Габни и бактериски болести
Зимско прскање (до почеток на бабрење на папките)	Меурка
Почеток на цветање (до 10% отворени цветови)	Монилија
Прво прскање после цветањето	Сливова оса и други штетници
	Монилија, пламеница
Второ прскање после цветањето	Сливова оса, лисни вошки и други штетници
	Пламеинца
	Штетници по појава и интензитет

НАПОМЕНА: Доколку насадот во минатата сезона бил одржуван во добра здравствена состојба, бројот на третирањата ќе биде помал. Зимското третирање задолжително да следи по извршената резидба, поради дезинфекција на раните настанати од резидбата.

Пред да пристапите кон третман, задолжително консултирајте се со стручни лица и преземете мерки за лична и заштита на човековата околина.

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Заради заштита на корисните инсекти (пчелите) кои го помагаат опрашувањето, третман против штетни инсекти да се врши само до фаза на 10% отворени цутови и после 80% паднати венечни ливчиња!!!

Прегледот на препарати за заштита од болести, штетници и плевели можете да го најдете во делот од порталот [Корисни алатки](#), а начинот и примена на методи од интегралната заштита кај јаболката можете да најдете во делот за [Интегрално производство на слива](#)